



ข้อปฏิบัติ เพื่อลดการบาดเจ็บจากน้ำกรด ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง

1. ใส่เสื้อผ้าปกปิดร่างกายให้มิดชิด
2. ให้สวมหมวกป้องกันศีรษะและปิดหน้ากากพลาสติกตลอดเวลา
3. เตรียมน้ำใส่กระติกน้ำส่วนตัวบุคคลให้พร้อมใช้
4. หน่วยทหารเตรียมถังน้ำ หรือรถน้ำพร้อมใช้เมื่อมีเหตุการณ์
5. ผู้ประสบเหตุสงสัยถูกน้ำกรดหรือสารพิษอื่นๆ ให้ตะโกนแจ้งเตือนผู้อื่นทราบทันที เพื่อการป้องกันและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ถูกน้ำกรด

1. ถอด เสื้อผ้า ถุงมือ รองเท้า หน้ากากที่สัมผัสน้ำกรดทิ้ง
2. ถ้าเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาด หรือน้ำเกลือปราศจากเชื้อ ปริมาณมาก
3. ล้างบริเวณที่บาดเจ็บ ด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ เพื่อลดความเข้มข้นกรดออก
4. ใช้ผ้าก๊อซ หรือผ้าสะอาด ชุบน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือปิดแผลไว้ แล้วส่งต่อโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
5. ถ้ามีปัญหาสูดหายใจเข้าไป หรือมีอาการหายใจลำบาก ให้รีบนำผู้ป่วยไปที่ รพ.พยาบาลเพื่อรับออกซิเจน แล้วรีบส่งต่อโรงพยาบาลทันที

ด้วยความปรารถนาดี

หน่วยตรวจโรคที่ 13 กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.พระมงกุฎเกล้า